

ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

OMALIZUMABE FRASCO-AMPOLA (150MG)

ONDE ARMAZENAR

DEVE SER MANTIDO SOB REFRIGERAÇÃO, ENTRE 2 E 8 ° C. NÃO CONGELAR.

RECONSTITUIÇÃO

É RECOMENDADO QUE O MEDICAMENTO SEJA APLICADO IMEDIATAMENTE APÓS A RECONSTITUIÇÃO. SE NÃO FOR USADO IMEDIATAMENTE O TEMPO DE ARMAZENAGEM É DE NO MÁXIMO 24 HORAS EM GELADEIRA (ENTRE 2 E 8° C) OU DE NO MÁXIMO 2 HORAS EM TEMPERATURA AMBIENTE (< 25 ° C).

DISSOLUÇÃO

APÓS A RECONSTITUIÇÃO, O MEDICAMENTO DEMORA ENTRE 15 E 20 MINUTOS PARA SUA COMPLETA DISSOLUÇÃO. EM ALGUNS CASOS PODE DEMORAR UM POUCO MAIS. O MEDICAMENTO RECONSTITUÍDO TERÁ ASPECTO LEVEMENTE CLARO OU OPACO.

FIQUE ATENTO

COMO O PRODUTO RECONSTITUÍDO É UM POUCO VISCOSO, DEVE-SE TER O CUIDADO DE RETIRAR TODO O PRODUTO. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE A BULA DO MEDICAMENTO.

