



Produzido: 19/08/2022

Revisado: 19/01/2023

MEDICAMENTO: Glibenclamida 5 mg**VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ORAL****ARMAZENAMENTO: SECO****CONTROLADO: NÃO**

Indicações

Tratamento do diabetes melito não insulino-dependente (Tipo II). É um agente antidiabético oral derivado da sulfoniluréia que atua tanto por estimulação da secreção de insulina, como pelo aumento da resposta à insulina pelos tecidos.

Contraindicações

Diabetes insulino-dependente (Tipo I), coma diabético, descompensação metabólica do diabetes (especialmente pré-coma e cetoacidose), insuficiência renal grave.

Gravidez e amamentação: Categoria B. O risco fetal não pode ser descartado. Não deve ser utilizado por grávidas sem indicação médica.

Posologia

Inicial de 2,5 a 5 mg por via oral uma vez ao dia; titular em incrementos não superiores a 2,5 mg por semana com base na resposta glicêmica; Manutenção de 1,25 a 20 mg por via oral uma vez ao dia ou em 2 doses fracionadas; MÁX. 20 mg/dia.

Interações medicamentosas

- **Contraindicado:** Bosentan.
- **Maior:** Aspirina, Ciprofloxacino, Cloroquina, Hidroxicloroquina, Levofloxacino, Norfloxacino
- no, Pioglitazona; **MANEJO:** Monitoramento e ajuste de dose da metformina se necessário.
- **Moderado:** Atenolol, Carvedilol, Bisoprolol, Metoprolol, Propranolol, Rifapentina, dentre outros. **MANEJO:** Ajuste de dose da metformina se necessário.

Precauções

Evitar o uso em pacientes idosos devido ao aumento do risco de hipoglicemia grave prolongada;

Ocorrência aumentada de hipoglicemia quando a ingestão calórica é deficiente, após exercício intenso ou prolongado, quando o álcool é ingerido ou quando mais de um agente redutor de glicose é usado;

Pacientes debilitados ou desnutridos têm risco aumentado de hipoglicemia.

Efeitos adversos

Este medicamento pode causar hipersensibilidade cutânea, visão turva, azia ou náusea.

Orientações para o paciente

- É importante que o paciente seja orientado a realizar alimentações espaçadas ao longo do dia para diminuir o risco de experimentar episódios de hipoglicemia;
- Orientar o paciente a monitorar sinais/sintomas de hiper ou hipoglicemia e relatar dificuldades no controle glicêmico, especialmente em momentos de estresse causado por infecção, febre, trauma ou cirurgia.
- O paciente deve tomar o comprimido no café da manhã ou na primeira refeição principal do dia;
- O paciente não deve beber álcool enquanto estiver tomando este medicamento.
- Orientar ao monitoramento de sinais/sintomas de hiperglicemia ou hipoglicemia e a relatar dificuldades no controle glicêmico (períodos de estresse causado por infecção, febre, trauma ou cirurgia).
- Orientar o cuidado ao fazer atividades que exigem prontidão ou coordenação mental, tais como dirigir ou operar máquinas pesadas.